

DB50

重 庆 市 地 方 标 准

DB50/T 1249—2022

中高山地区混播草地建植技术规程

2022 - 06 - 01 发布

2022 - 09 - 01 实施

重庆市市场监督管理局 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市农业农村委员会提出并归口。

本文件起草单位：重庆市畜牧科学院。

本文件主要起草人：冉启凡、范彦、何玮、徐远东、朱瑞芬、陈积山、蒋安。





中高山地区混播草地建植技术规程

1 范围

本文件规定了中高山地区混播草地的术语和定义、土地选择与整理、种植、草地管理、利用方式。本文件适用于中高山地区混播草地的建植。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6141 豆科草种子质量分级
- GB 6142 禾本科草种子质量分级
- GB/T 8321 农药合理使用准则
- NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料
- NY/T 1342 人工草地建设技术规程
- NY/T 1237 草原围栏建设技术规程
- NY/T 1343 草原划区轮牧技术规程

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

净活种子 life seed

洁净而具有发芽能力的种子。

[来源：NY/T 1342 人工草地建设技术规程，3.3]

3.2

混播 mixed sowing

在同一地块上，同期混合两种或两种以上牧草的种植方式。

[来源：NY/T 1342 人工草地建设技术规程，3.8]

4 土地选择与整理

4.1 土地选择

地势平缓开阔，土壤质地和水热条件适宜。

4.2 土地整理

除草除杂，翻耕，视地面状况可采用常规耕作或少耕；要求土块细碎，地面平整；施用基肥，每 667m² 施有机肥 1000 kg ~ 2000 kg 为宜。

[来源：NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料，9.3.1]

5 种植

5.1 种植时间

3~4月春播，9~10月秋播。

5.2 草种选择及组合

根据生产利用目的，以及当地土壤气候条件，选择适宜草种和品种，草种组合以 40 % 鸭茅 +40 % 苇状羊茅 +10 % 白三叶 +5 % 紫花苜蓿 +5 % 百脉根，或 80 % 鸭茅 +10 % 百脉根 +5 % 白三叶 +5 % 紫花苜蓿为宜。草种质量符合 GB 6141 豆科草种子质量分级、GB 6142 禾本科草种子质量分级标准三级以上。

5.3 播种量

每 667 m² 净活种子播种量为 2.5 kg ~5 kg。

5.4 播种

撒播和条播均可。撒播时，将种子混合后，均匀地撒在土壤表面，并覆薄土。条播宜开浅沟，行距为 15 cm ~ 30 cm。

6 草地管理

6.1 查苗补播

播种后及时查苗，对弱苗、漏苗区域进行补播。

6.2 草地除杂

苗期及时清除杂草，松土保墒。

6.3 追肥

在 3~4 片叶时要及时追苗肥，每667 m²施尿素 5 kg~10 kg。每次刈割或者轮回放牧后应及时追肥，以磷钾肥为主。

6.4 病虫害防治

病虫害防治以预防为主，一旦发生要立即采取措施予以控制，农药使用按照 GB/T 8321 的规定执行。

6.5 围栏建设

围栏建设可在播种后进行，按照 NY/T 1237 规定执行。

7 利用方式

7.1 刈割利用

刈割时间根据植株生长高度和生产需求确定，每次刈割留茬高 5 cm ~10 cm。鲜草可青饲或青贮，亦可调制干草。

7.2 放牧利用

草地放牧按照 NY/T 1343 的规定执行。

